

PRONTO 50 WP

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

BENOMYL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BENZIMIDAZOL
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	1

MODO DE ACCIÓN

PRONTO® 50 WP es un fungicida sistémico para el control de enfermedades en tratamiento foliar o de semilla; se utiliza en tratamientos preventivos y curativos. Es un inhibidor eficaz de la división celular de los hongos fitopatógenos. Los tubos germinativos de las esporas fitopatógenas, con la aplicación de este producto, se distorsionan y su crecimiento se inhibe durante la división celular, generando un efecto de control sobre el desarrollo de la enfermedad. Es un fungicida de amplio espectro, sistémico, curativo y protectante para el control de enfermedades foliares, del tallo y raíces en una amplia gama de cultivos. Posee propiedades residuales generando una fina película de protección que impide la germinación de nuevas esporas, presentando un efecto de acción prolongado durante varias semanas.

USOS PARA GUATEMALA:

USOS		
CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Moho gris <i>Stemphylium solani</i> Tizón tardío <i>Alternaria solani</i>	1.0 – 2.0 kg/ha (0.7 – 1.5 kg/mz) Cada 5 a 10 días.
Café <i>Coffea arabica</i>	Mal de hilachas <i>Pyricularia koleroga</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i>	0.35 – 0.5 kg/ha (0.25 – 0.35 kg/mz) Cada 15 días.
Zapallo, Calabaza, Calabacin <i>Cucurbita maxima</i> Güisquil/Chayote <i>Sechium edule</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino	Mildiu vellosa <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mildiu polvoriento <i>Erysiphe cichoracearum</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i>	0.5 – 1.0kg/ha (0.35– 0.7 kg/mz) Cada 5 a 10 días.

<i>Cucumis sativus</i>		
Arroz <i>Allium sativum</i>	Piricularia <i>Pyricularia oryzae</i> Cercospora <i>Cercospora oryzae</i>	0.4 – 0.6 kg/ha (0.28 – 0.42 kg/mz)
Frijol <i>Phaseolus spp.</i>	Mancha de la hoja <i>Cercospora spp.</i> Roya <i>Uromyces phaseoli</i>	0.4 – 0.5kg/ha (0.28 – 0.35/mz) Cada 8 días.

PRESENTACIONES

500g, 1kg, 20kg

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.