

# VIGILANT 50 WG

## FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

AZOXYSTROBIN

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>FAMILIA QUÍMICA</b>	ESTROBILURINA
<b>CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA</b>	GHS: 5
<b>USOS</b>	Fungicida
<b>GRUPO FRAC</b>	11

### MODO DE ACCIÓN

**VIGILANT® 50 WG** es un fungicida sistémico y traslaminar que posee propiedades preventivas y curativas para el control de un amplio espectro de enfermedades. Actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en el hongo al evitar la transferencia de electrones, resultando en la inhibición de la germinación de esporas y el crecimiento de los micelios. Además, muestra actividad erradicante y antiesporulante.

#### USOS PARA GUATEMALA:

### USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Guisquil/Chayote <i>Sechium edule</i> Zapallo, Calabaza, Calabacín <i>Cucurbita máxima</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i>	Mildiu polvoriento <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaeroteca fuliginea</i> Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> Alternaria <i>Alternaria cucumerina</i> Gomosis <i>Didymella bryoniae</i>	285 – 320g/ha (200 – 224 g/mz)
Arroz <i>Oryza sativa</i> Avena <i>Avena sativa</i> Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i> Maíz dulce <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum bicolor</i> Pastos	Tizón de la hoja <i>Pyricularia oryzae</i> Rizoctonia <i>Rhizoctonia solani</i> Escaldado de la hoja <i>Rhynchosporium oryzae</i> Mancha marrón <i>Helminthosporium oryzae</i> Roya <i>Puccinia sorghi</i>	200 – 400 g/ha (140 – 280 g/mz)
Arveja <i>Pisum sativum</i> Frijol/Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mancha negra <i>Ascochyta pisi</i> Roya <i>Uromyces phaseoli</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	250g/ha (175g/mz)
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	200 g/ha (140g/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annuum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Mancha folliar <i>Cercospora capsici</i> Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	

### PRESENTACIONES

10g, 100g, 500g

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.

